



## Check List d'évaluation ou d'aide à l'observance PICCLINE :

RÉFECTION DE PANSEMENT, MANIPULATIONS, SURVEILLANCE DE LA LIGNE ET RETRAIT D'UN PICCLINE

PICCLINE = Cathéter veineux central de longue durée inséré par voie périphérique

ÉTABLISSEMENT	Identité de l'opérateur : <i>(à renseigner en fonction de l'objectif recherché)</i>
SERVICE	Étiquette ou Nom/ Prénom Patient : <i>(à renseigner en fonction de l'objectif recherché)</i>

### TENUE

#### TENUE SOIGNANT

- Tenue professionnelle propre
- OU surblouse à usage unique non stérile
- Coiffe
- Masque à usage médical

#### TENUE PATIENT

- Toilette réalisée au préalable
- Tenue propre
- Masque à usage médical (ou tête tournée du côté opposé)
- Décubitus latéral (ou à défaut, dorsal) du côté du PICC avec bras éloigné du torse
- Bras largement découvert avec accès aisé

### MATÉRIEL

- Réalisation d'une Friction Hydro-Alcoolique (FHA)
- Préparation du matériel stérile (dont stabilisateur, set à pansements, gants stériles)

### AVANT LE SOIN

- Identité du patient vérifiée
- Information au patient effectuée
- Vérification de l'état cutané et de l'absence de signes cutanés locaux

#### Date de pose du PICCLINE

- Préciser s'il s'agit d'un premier pansement (24 heures après la pose)
- Graduation extériorisée du PICC / 1<sup>er</sup> pansement : .....
- Date et heure de réfection du pansement : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ \_\_H\_\_

### DÉROULEMENT DU SOIN

- Réalisation d'une FHA
- Retrait du pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains (**port de gants non stériles si souillures**)

**ATTENTION : Risque de déplacement du cathéter !**

**CONSEIL : Durant le soin, pour maintenir le cathéter en place, le fixer à la peau à distance du point de ponction à l'aide de bandelettes adhésives stériles**

- Retrait du stabilisateur
- Réalisation d'une FHA après retrait des gants
- Port de gants stériles OU utilisation d'un set à pansement (pincettes)

- **Si absence de souillure visible :** antiseptie large avec antiseptique alcoolique et séchage spontané  (temps de contact min. 30 sec.)

- **Si présence de souillures visibles :** nettoyage  rinçage  séchage  antiseptie large avec antiseptique alcoolique et séchage spontané  (temps de contact min. 30 sec.)

- Changement de gants stériles
- Réalisation d'une FHA
- **Port de gants stériles**
- Mise en place du nouveau stabilisateur
- (Si présence de flèches, les positionner vers le point de ponction)
- Pansement adhésif stérile, semi-perméable et transparent

### LES INCONTOURNABLES

- **Réalisation d'une FHA** avant toute manipulation
- **Manipulation** des valves, bouchons et robinets avec des compresses stériles imprégnées d'antiseptique alcoolique
- **Réfection du pansement** dès que décollé ou souillé ou maximum tous les 8 jours + changement du stabilisateur tous les 8 jours ou si souillé, de la ou des valves bidirectionnelles le cas échéant en même temps que le pansement maximum tous les 8 jours
- **Réalisation d'un rinçage pulsé** par au moins 3 poussées successives (seringue de 10mL de NaCl minimum) après toute injection / prélèvement sanguin
- **En cas de non utilisation, le système ne doit pas être clampé : quelle que soit la valve en place, procéder au retrait de tout prolongateur**

**Critère coché = Critère réalisé**

### SURVEILLANCE ET TRAÇABILITÉ

Graduation extériorisée du PICC à la fin du soin (Nombre de repères) : \_\_\_\_\_

Traçabilité de la réfection du pansement dans le dossier du patient et/ou dans le carnet de surveillance



**Le stabilisateur est un système adhésif adapté et obligatoire pour fixer le PICCLINE en place.**



## SURVEILLANCE

A J+4, changement de la ligne principale

Cocher « OUI » si présence d'au moins un des signes d'alertes et préciser.

Pour les mesures correctrices (dépose, réfection du pansement, soins locaux) se reporter au dossier de soins et/ou au carnet de surveillance

ÉTABLISSEMENT	<u>J1</u>	<u>J2</u>	<u>J3</u>	<u>J4</u>	<u>J5</u>	<u>J6</u>	<u>J7</u>	<u>J8</u>
SERVICE	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Étiquette ou Nom / Prénom Patient :	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>	<i>Si oui, préciser :</i>
	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature

### RETRAIT D'UN PICC Line

<b>Identité de l'opérateur :</b> <i>(En fonction de l'objectif recherché)</i>	<b>Date et Heure de retrait :</b> __ / __ / ____ __ H __
<b>Avant le soin :</b> s'assurer qu'un médecin puisse intervenir à tout moment	
Identité du patient vérifiée avant le retrait	<input type="checkbox"/>
Information au patient effectuée	<input type="checkbox"/>

### SIGNES D'ALERTES

- |  |  |   |
|--|--|---|
| [1] Rougeur, gonflement ou induration au point d'insertion du PICCline ou sur son trajet<br>[2] Douleur durant ou en dehors des injections<br>[3] Sensibilité du point d'insertion ou écoulement | [4] Signes généraux d'infection (hyperthermie...)<br>[5] Pansement non occlusif, souillé<br>[6] Reflux veineux faible ou absent<br>[7] Mauvais débit de perfusion<br>[8] Injection à la seringue difficile | [9] Cathéter déplacé<br>[10] Cathéter coudé ou fissuré<br>[11] Cathéter obstrué<br>[12] Fuite au niveau du cathéter |
|--|--|---|

### TENUE

#### TENUE SOIGNANT

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Tenue professionnelle propre                                    | <input type="checkbox"/> |
| OU surblouse à usage unique non stérile                           |                          |
| - Masque à usage médical avec visière ou lunettes de protection   | <input type="checkbox"/> |
| - Gants non stériles ou gants stériles si mise en culture du PICC | <input type="checkbox"/> |

#### TENUE PATIENT

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Tenue propre  | <input type="checkbox"/> |
| - Masque à usage médical (ou tête tournée côté opposé) si mise en culture du PICC | <input type="checkbox"/> |
| - Installation en décubitus dorsal  | <input type="checkbox"/> |

### MATÉRIEL

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Réalisation d'une Friction Hydro-Alcoolique (FHA)                                 | <input type="checkbox"/> |
| - Préparation du matériel sur un plan de travail préalablement nettoyé / désinfecté | <input type="checkbox"/> |

### DÉROULEMENT DU SOIN - RETRAIT DU CATHÉTER

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Réalisation d'une FHA  | <input type="checkbox"/> |
| - Retrait du pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains                         | <input type="checkbox"/> |
| - Retrait du stabilisateur   | <input type="checkbox"/> |
| - Réalisation d'une FHA  | <input type="checkbox"/> |
| - Port de gants adaptés (non stériles ou stériles)   | <input type="checkbox"/> |
| - Retrait du cathéter en tirant doucement  | <input type="checkbox"/> |
| - Désinfection du point de ponction avec une compresse imprégnée d'un antiseptique alcoolique        | <input type="checkbox"/> |
| - Compression du point de ponction   | <input type="checkbox"/> |
| - Application d'un pansement stérile absorbant et occlusif laissé en place pendant une heure minimum | <input type="checkbox"/> |

### SURVEILLANCE ET TRAÇABILITÉ

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Vérifier l'intégralité du PICC lors du retrait (noter la graduation et la comparer avec la graduation initiale) | <input type="checkbox"/> |
| - Traçabilité du retrait dans le dossier de soins   | <input type="checkbox"/> |