

**A RISQUE INFECTIEUX ELEVE EN SECTEUR CONVENTIONNEL**

- Chaque mesure qui a fait l'objet d'une recommandation est signalée (Réf. : XXX). Quand aucune recommandation n'a pu être trouvée, la mention AE (accord d'expert) figure entre parenthèses.

**Mesures à mettre en œuvre par les professionnels**

<b>Hygiène des mains</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter les <b>5 indications</b> à l'hygiène des mains</li> </ul>
<b>Tenue, Equipements de protection individuelle</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Porter systématiquement :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Une tenue professionnelle propre</li> <li>○ Dans la chambre du patient : un masque à usage médical</li> </ul> </li> <li>• <b>Ne pas porter systématiquement</b> et respecter les précautions standard : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Gants</b> : en cas de risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques</li> <li>○ <b>Tablier plastique</b> : en cas de <b>soins souillants, mouillants</b></li> <li>○ <b>Lunettes de protection</b> : en cas de risque de projections de sang ou de liquides biologiques</li> </ul> </li> <li>• <b>Inutile de porter :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Une tenue spécifique</b> dédiée au secteur</li> <li>○ <b>Une coiffe</b> recouvrant tous les cheveux (sauf si indiquée pour le soin, ex soins sur PAC)</li> <li>○ Des surchaussures</li> </ul> </li> </ul>
<b>Gestion de l'environnement et du matériel</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrer tous les points d'eau utilisés par les patients (filtration 22 microns)</li> <li>• Préférer le matériel à usage unique ou à défaut, individualiser le matériel ré utilisable (réf. : AE)</li> <li>• En cas d'emploi de matériel ré utilisable, assurer une désinfection avant d'entrer dans la chambre au moyen d'un détergent désinfectant (réf. : AE)</li> <li>• <b>Gestion de l'environnement du patient :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ réaliser un <b>bionettoyage au minimum quotidien</b> de la chambre au moyen d'un détergent désinfectant</li> <li>○ insister sur <b>l'environnement proche</b> du patient et les surfaces fréquemment manipulées</li> </ul> </li> </ul>
<b>Organisation de la prise en charge</b> (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regrouper les soins</li> <li>• Limiter le flux de personnels dans la chambre</li> <li>• Maintenir les fenêtres fermées et limiter le temps d'ouverture des portes</li> </ul>
<b>Alimentation</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposer une alimentation à faible risque : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ exclure certains aliments (cf. liste SF2H)</li> <li>○ laver soigneusement les fruits et les légumes crus avant toute consommation (y compris s'ils sont ensuite pelés)</li> <li>○ cuire les viandes et poissons à cœur (volaille &gt; 180°C, autres viandes et poissons &gt; 160°C), cuire les œufs (attention aux préparations contenant des œufs crus (mousses...))</li> <li>○ ne pas consommer de produits laitiers au lait cru → consommer les produits issus de lait pasteurisé ou micro-filtré</li> </ul> </li> <li>• Proposer de l'eau de boisson embouteillée : bouteilles à changer toutes les 8h (sauf si conservation à 4°C → à changer toutes les 12h)</li> <li>• Assurer un traitement de la vaisselle au lave-vaisselle avec température de lavage &gt; à 60°C (réf. : AE)</li> </ul>

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT IMMUNODEPRIME  
**A RISQUE INFECTIEUX ELEVE EN SECTEUR CONVENTIONNEL**

Mesures ciblant les patients	
<b>Chambre individuelle</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Placer le patient en chambre seule obligatoirement</u></li> <li>• Système de traitement d'air mobile possible</li> </ul>
<b>Education du patient</b> (Réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser une éducation à l'hygiène des mains lors de l'admission du type « communication soignant / soigné » (Réf. : SF2H, mars 2018)</li> <li>• Mettre à disposition des patients alités des flacons de produit hydro alcoolique</li> <li>• Informer le patient sur la nature des mesures mises en œuvre et les modalités de respect de ces mesures</li> </ul>
<b>Déplacement du patient</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limiter les déplacements hors de la chambre</li> <li>• En cas de sortie de la chambre, le patient porte un masque à usage médical</li> </ul>
<b>Linge</b> (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer quotidiennement le linge de corps</li> <li>• Il est possible d'utiliser du linge personnel si et seulement si entretien en machine ≥ 60° C et passage au sèche-linge</li> <li>• A défaut, utiliser du linge hospitalier à usage unique</li> </ul>
<b>Effets personnels</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jouets plastiques, ordinateurs et de téléphones portables <b>autorisés</b> s'ils sont préalablement nettoyés avec un détergent-désinfectant</li> <li>• Journaux, revues, et livres neufs <b>autorisés</b> s'ils sont emballés</li> <li>• Pour tout autre objet personnel, solliciter l'avis du personnel hospitalier (réf. : AE)</li> </ul>

Mesures à mettre en œuvre par <u>tous</u> les visiteurs	
<b>Généralités</b> (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Différer sa visite en cas de signes d'infections (toux, rhinorrhée ...)</li> <li>• Limiter les entrées et sorties de la chambre pour réduire le nombre d'ouverture des portes</li> <li>• Limiter les visites</li> </ul>
<b>Hygiène des mains</b> (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposer une éducation à l'hygiène des mains lors de la première visite</li> <li>• Réaliser une hygiène des mains à l'entrée dans la chambre du patient</li> <li>• Avant tout contact avec le patient, réaliser une hygiène des mains</li> </ul>
<b>Tenue, Equipements de protection individuelle</b> (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer les bijoux de ses mains, les montres et dégager les avant-bras (Réf. : AE)</li> <li>• <b>Porter systématiquement :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dans la chambre du patient : un <b>masque à usage médical</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Dans le cadre de la délivrance des soins</b>, et dans le respect des précautions standard, <b>possibilité de revêtir</b> : gants, tablier plastique, lunettes de protection</li> <li>• <b>Inutile de porter :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Une surblouse</b></li> <li>○ <b>Une coiffe</b></li> <li>○ Des surchaussures</li> </ul> </li> </ul>